

## **RESONANCIA MAGNÉTICA DE PELVIS BLANDA**

**Día del examen:** Presentarse 30 minutos antes del examen con orden médica, **carnet de identidad y exámenes previos** de la zona de estudio.

- Requiere 4 horas de ayuno (Ni sólidos, ni leche).
- Contraindicación absoluta para implantes / elementos metálicos, mecánicos, electrónicos.
- Contraindicaciones para claustrofobia, déficit cognitivo, cuadros gripales graves, no tolerar posición acostado (decúbito), parches dérmicos.
- Informe sobre alergias a medios de contrastes, medio ambiente, alimentos, medicamentos o periodo de lactancia.
- Menores de edad deben asistir acompañados de un adulto.
- Si el examen se lo realizará un adulto, no asistir con menores de edad como acompañante.
  
- **IMPORTANTE:** Traer exámenes previos relacionados con el estudio.
- Si es diabético o hipertenso con antecedentes de insuficiencia renal, monorreno o mayor a 60 años, **debe traer su examen de Creatinina** (Vigencia un mes).
- **No debe suspender ningún tratamiento recetado por su médico tratante.**
- Si es alérgico a algún **medicamento y/o asmático**, debe seguir las siguientes indicaciones:
  - Debe tomar 1 comprimidos de **PREDNISONA 20MG** 12 horas antes y otro comprimido, 2 horas previas al examen.
  - Debe tomar 1 comprimido de **CLORFENAMINA 4MG O LORATADINA 10MG**, 2 horas previas al examen.